



המערך הארצי
לבריאות העטין
ואיכות החלב

עטרת הכללים לטיפול בדלקות עטין קליניות



מועצת החלב

1 **זהה את הרבע / חצי העטין הנגוע, והגדר את חומרת הדלקת לפי:**

- | | | |
|---|--|---|
| <p>דלקת קשה:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● שינויים בחלב. ● שינויים בעטין. ● ירידה חדה בחלב. ● סימנים כלליים: חום, חוסר תאבון, רביצה, שלשול. | <p>דלקת בינונית:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● שינויים בחלב. ● שינויים בעטין. ● (נפיחות, חום, כאב, אודם. ● ירידה בחלב. | <p>דלקת קלה:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● שינויים בחלב. ● (גבן, פתיתים, שינויים בצבע). |
|---|--|---|

2 **דווח** מיד לאחראי.

3 **דגום** מיידית מרבע / חצי העטין לפי ההנחיות המקצועיות למבחנה סטרילית בלבד, ושלח למעבדת מאל"ה בקיסריה, לאבחון הגורם ולכצוע מבחני רגישות לאנטיביוטיקה.

4 **סמן את** החיה הנגועה / המטופלת בצורה בולטת לעין, וחלוב אותה **בסוף החליבה** ולכלי נפרד (חל איסור מוחלט להוסיף את החלב הדלקתי למיכל הכללי).

5 **טפל** בהתאם לחומרת הדלקת ולפי הנחיות הרופא המטפל, כפי שנכתבו בפרוטוקול הטיפולים.

6 במתן **טיפול תוך-עטיני**, הקפד על מתן הטיפול בצורה נכונה שתמנע זיהום משני.

7 **תעד** כל אירוע במחשב או במחברת מעקב:

- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● תאריך ● מספר החיה ● הרבע / חצי הנגוע | <ul style="list-style-type: none"> ● הסימנים הקליניים ● חומר הטיפול ● מינון | <ul style="list-style-type: none"> ● זמן המתנה לשיווק |
|--|--|--|

8 **שטוף, חטא ושטוף** את אשכול החליבה והידיים אחרי טיפול או חליבת פרה עם דלקת עטין קלינית.

9 **שלח** דוגמא חלב למחלבה, או **בדוק** עצמאית לנוכחות שאריות חומרים מעכבים בחלב (גם טיפול הניתן ברבע אחד, פוסל את כל החלב מהעטין המטופל).

10 **דגום שנית** מהרבע / חצי הנגוע, שבועיים **מסוף** הטיפול, למעקב היעלמות הגורם לדלקת.

