



משרד החקלאות ופיתוח הכפר

השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה

מחלת קטרית העור (LSD Lumpy Skin Disease) בבקר בצפון הארץ –

עדכון 27.12.2012

ביולי 2012 אובחנה בו זמנית במספר עדרי בקר לבשר בצפון רמת הגולן מחלת קטרית העור. מאז, המשיכה המחלה להתפשט לכיוון דרום ומערב. נכון להיום הנקודה המערבית ביותר בה אובחנה המחלה בהתפרצות זו היא קיבוץ מורן בגליל והדרומית ביותר – קיבוץ עין גב בחוף המזרחי של הכנרת.

שיעור התחלואה בעדרים נע בין 0.1% ל- 95% ושיעור התמותה בין 0% ל- 25%. בעוד שבקיץ הופיעו כמעט כל המקרים בעדרי בקר לבשר במרעה ובמפטמות, לאחרונה החלו להופיע מקרים גם במספר רפתות חלב. ההסבר לשינוי במגמה הוא כי המחלה מועברת על ידי חרקים מעופפים ועוקצים שנראה כי בחורף הם מעדיפים את סביבת רפת החלב החמימה יותר מאשר סביבת בקר חשוף במרעה.

גורם המחלה: נגיף (וירוס) עמיד מאוד לתנאי הסביבה ועלול לשרוד באזורים הנגועים במחלה למשך חודשים רבים, בעיקר אם אינו חשוף לשמש.

הפצה: ההדבקה העיקרית מתרחשת באמצעות חרקים עוקצים, כגון זבובים. החשוד העיקרי בהתפרצות הנוכחית הוא זבוב הקרן אך יתכן כי מעורבים גם מעבירים אחרים.

סימני המחלה: **הסימן המובהק ביותר הוא קיטריות (גבשושיות עגולות ובלטות) בעור הבקר, בין בודדות עד רבות, בגדלים של מ"מ אחדים עד ס"מ אחדים, על פני אזורים**

נרחבים של העור. סימנים נוספים; ריור מוגבר, הפרשות מהעיניים ומהאף וחום גבוה. עד כה אובחנו 114 עדרים נגועים, מתוכם 14 רפתות חלב. סה"כ חלו עד סוף 2012 כ- 3,700 ראשי בקר, מתו כ- 400 והומתו כ- 70.

טיפול: ככלל המחלות הנגיפיות אין טיפול ספציפי למחלה אלא טיפול תומך בלבד. פרטים אצל הרופאים המטפלים.

מניעה: בין אמצעי המניעה המועילים: חיסון, ריסוס, וטיפולים אחרים להקטנת מספר החרקים העוקצים. יש לרסס את הבקר רק בחומרים המורשים בלבד (ראה אתר אינטרנט של השירותים הווטרינריים):

http://www.vetserv.moag.gov.il/NR/ronlyres/FFC6A983-CB4D-4D2F-AC74-2A3840273C22/0/tahshirey_hadbara_01072012.pdf

הלשכות הווטרינריות, לעתים בסיוע וטרינרים נוספים, מבצעות חיסון סביב המוקדים החדשים המתגלים, להגנה על העדרים הסמוכים.

הגבלות על העברת בקר לגידול מוטלות באזורים הנגועים. פרטים בלשכות.

חובת דיווח: ערנות ודווח של המגדלים לשירותים הווטרינריים הינם חשובים ביותר. חשד ואיתור מוקדם של מקרי תחלואה ראשוניים בכל עדר יכולים להקטין את התחלואה והנזק הכלכלי לעדר הנגוע ולעדרים שכנים. לכן עם כל חשד למחלה חובה להודיע מיד לרופא



משרד החקלאות ופיתוח הכפר

השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה

הווטרינר המטפל ו/או ללשכה הווטרינרית הרלוונטית. להלן מספרי הטלפון בלשכות הווטרינריות:







לשכה	טלפון
ראש פינה	04-6808100
עכו	04-9910640
גלבוע	04-6489120
חדרה	04-6303406
כנות	08-8591533
לשכת באר שבע	08-6235755

מו"פ: בימים אלה נבחנים תרכיב חדש וכן פרוטוקול חדש לתרכיב הקיים כדי לשפר את יעילות ההגנה נגד המחלה. אנו יוזמים גיוס ידע וביצוע מחקרים נוספים בשיתוף עם האקדמיה החקלאית וגורמים בינלאומיים, לשיפור יכולת ההתמודדות עם גורמי הפצת המחלה ודרכים למניעתה.



משרד החקלאות ופיתוח הכפר

השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה

קטריות בבקר לבשר	מפת אירוועי קטרת העור 2012 – נכון לתאריך 27/12/12
	
פרה חולה במחלה, רובצת	קטריות בפרה חולבת. הכתם הלבן הוא חומר חיטוי שרוסס לאחר נטילת קטרת למעבדה
	
קטריות באזור האחורי	קטריות בבקר לחלב - תקריב
	
עדר בקר לבשר נגוע	