

### הנדון: מחלת הפה והטלפיים בארבל

1. ביום ה' אחה"צ, 26.02.09, התקבלה הודעה על חשד למחלת הפה והטלפיים (פוי"ט) בדיר צאן בארבל.
2. מדגימות שנשלחו למעבדה לפוי"ט בחטיבה לוורולוגיה של המכון הווטרינרי בבית דגן, בודד אתמול נגיף הפוי"ט; טרם הוגדר זן הנגיף.
3. האזור ברדיוס של 10 ק"מ הוכרז כנגוע. ראה מפה מצורפת.
4. כל האישורים שנתנו להעברת הבקר והצאן באיזור לפני ההכרזה **מבוטלים**.
5. בכניסה למשקים שבהסגר יש להפעיל את בריכות הטבילה.
6. **הגבלות על המשקים שבהסגר - "אזור נגוע" (למעט המוקד):**
  - א) העברת בעלי-החיים לגידול תתבצע באישור מנהל הלשכה הווטרינרית ראש-פינה – מצ"ב התנאים להעברת בקר וצאן לגידול בין האזורים השונים (נספח מס' 1).
  - ב) העברה לשחיטה בבתי-המטבחים תתבצע באישור מנהל הלשכה הווטרינרית ראש-פינה – מצ"ב התנאים להעברת בקר וצאן המיועד לשחיטה בבתי מטבחים בין האזורים השונים (נספח מס' 2).
  - ג) חל איסור מוחלט על העברת בקר וצאן משטחי המרעה שבשטח ההסגר.
  - ד) המיכליות המפנות חלב, הרכבים המספקים מזון לבע"ח והרכבים של נותני השירות השונים למשקים באזור הנגוע חייבים לעבור חיטוי ביציאה מהמשקים.
  - ה) חל איסור על יצוא חלב ומוצריו שמקורם ממשקים אשר נמצאים באזור הנגוע.
7. **הגבלות למשקי המוקד:**
  - א) העברה לגידול מאזור המוקד אסורה למשך חצי שנה מיום העלמות הסימנים הקליניים.
  - ב) העברה לשחיטה בבתי מטבחים תתבצע בכפוף לתנאים, כמפורט בנספח מס' 2.
  - ג) חלב מהמוקד יופנה על פי הוראתו והנחייתו של הרופא הווטרינר הראשי לפיקוח על מוצרים מן החי. החלב יועבר למחלבה ייעודית ברכב ייעודי שיחוטא בכניסה וביציאה מהמשק.
  - ד) חל איסור מוחלט על הוצאת זבל וצמר. האיסור יהיה בתוקף שלושה שבועות לאחר היעלמותם של הסימנים הקליניים.
  - ה) הטיפול בפגרים הוא על פי ההנחיות בנהל ISO – ראה הוראה 03-01-12 פרק 9 (סילוק בהמות שמתו בהיותן בעדר נגוע).
8. **הנחיות ללשכות הווטרינרית:**
  - א) כל הלשכות, למעט לשכת ראש-פינה, יתנו היתרי העברה למגדלים אשר בשטח שיפוט לשכתם.
  - ב) היתרי העברה בין הלשכות, למעט לשכת ראש-פינה, יינתנו בכפוף לאישורו של מנהל הלשכה הרלבנטית בלבד.
  - ג) תוקף היתרי העברה יוגבל ל- 24 שעות בלבד. נא להקפיד על רישום מדויק של פרטי המוביל והמתייצב, קרי: זיהוי על פי תעודת זהות.
  - ד) ההנחיות הן בתוקף עד לביטולן המפורש בכתובין.

9. הנחיות ללשכה הווטרנרית ראש-פינה :
- (א) הבקר ברפתות החלב שחוסן לפני 6 חודשים ויותר, יחוסן מיידית; בקר מגיל 3 עד 18 חודשים שחוסן במחצית השנה האחרונה, יחוסן שוב.
- (ב) הבקר במפטמות יחוסן בחיסון דחף.
- (ג) הבקר לבשר שחוסן לפני חצי שנה ויותר, יחוסן מיידית; בקר לבשר מגיל 3 ועד 18 חודשים שחוסן במחצית השנה האחרונה, יחוסן שוב.
- (ד) הצאן שחוסן לפני חצי שנה ויותר, יחוסן מיידית; צאן מגיל חודשיים ועד 18 חודשים שחוסן במחצית השנה האחרונה, יחוסן שוב.

10. הנחיות ליחידת הפיצו"ח :
- (א) אכיפת הסגר באזור ההסגר, במשקים ובדרכים; מניעת כניסת זרים.
- (ב) הגברת הפיקוח בכבישי המדינה.
- (ג) הנחיות נוספות תינתנה בהתאם לצורך.

11. לוט: נספחים 3 – 1.

ב ב ר כ ה

ד"ר ר. עוזרי  
מנהל השו"ט בשדה

העתקים :

גבי יעל שאלתיאלי, מנכ"ל משרד החינוך ופיתוח הכפר  
ד"ר מ. חיימוביץ, מנהל השו"ט  
ד"ר ב. יעקובסון, מנהל המכון הווטרנרי  
מר י. מאירוביץ, ס/מנהל השו"ט (אמרכלות)  
גבי דפנה יוריסטה, דוברת משרד החקלאות ופיתוח הכפר  
ד"ר א. נילי, ר.ו. ראשי לפקוח על מוצרים מן החי  
ד"ר ח. ידן, מנהל המעבדה לפו"ט  
ד"ר ש. גראזי, ר.ו. ראשי ליבוא/יצוא  
ד"ר ש. זמיר, ר.ו. למחלות צאן  
ד"ר נ. גלאון, רופא ראשי "החקלאית"  
ד"ר מ. עבד אל חלק, ר.ו. ראשי לבתי-מטבחים  
ד"ר צ. בנאור, המח' לפיקוח על מוצרים מן החי  
ד"ר מ. בלאיש, המח' לאפידמיולוגיה  
ד"ר דגנית בן-דב, הממונה עפ"י חוק צעבי"ח  
ד"ר צביה מילדנברג, המח' לוירולוגיה  
ד"ר אבילין פנצר, צה"ל  
מר רואי קליגר, מנהל יחידת הפיצו"ח  
ד"ר ר. קינג, רשות הטבע והגנים  
מר ש. דרורי, מנכ"ל מועצת החלב  
ד"ר ש. פרידמן, מנהל מקצועי, מאל"ה  
מר חיים דיין, ארגון מגדלי הבקר (אמב"ל)  
ד"ר יואל זרון, מנהל מקצועי, "שיאון"  
התאחדות מגדלי הבקר  
הסיירת הירוקה  
מר סמיר מועדי, מתאם חקלאות יו"ש  
מר אורי מדר, מתאם חקלאות ארז.

פוט  
לשכת ראש-פינה

## נספח מספר 1

תנאים להעברת בקר וצאן לגידול בין האזורים השונים :

- א. הבקר והצאן מחוסנים על פי הגדרות חיסון מלא (ראה נספח מס' 3).
- ב. הבקר מלווה באישור וטרינרי, שיינתן על ידי הרופא הווטרינר המטפל, על חופשיותו מסימני המחלה. האישור יועבר למנהל הלשכה הרלוונטית.
- ג. זמני המתנה להעברת בעלי-חיים לגידול מהאזורים השונים :

מקור הבקר	יעד הבקר	זמן המתנה להעברה
מוקד	אזור הסגר	חצי שנה לאחר העלמות הסימנים הקליניים
מוקד	אזור חופשי	חצי שנה לאחר העלמות הסימנים הקליניים
אזור הסגר	מוקד	חודשיים לאחר העלמות הסימנים הקליניים
אזור הסגר	אזור הסגר	חודש לאחר העלמות הסימנים הקליניים
אזור הסגר	אזור חופשי	חודשיים לאחר העלמות הסימנים הקליניים
אזור חופשי	אזור הסגר	חודש לאחר העלמות הסימנים הקליניים
אזור חופשי	מוקד	חודשיים לאחר העלמות הסימנים הקליניים

## נספח מספר 2

תנאים להעברת בקר וצאן המיועד לשחיטה בבתי מטבחים בין האזורים השונים :

1. העברה מותרת ממשקים חופשיים קלינית ממחלת הפו"ט, בהם הבקר והצאן, מגיל 3 חודשים ומעלה, מחוסנים חיסון מלא כנגד מחלת הפו"ט. ראה הגדרת חיסון מלא (נספח מס' 3).
2. הבקר או הצאן חייב באישור קליני המעיד על חופשיותו מסימני מחלה. האישור יינתן ע"י הרופא הווטרינר המטפל למנהל הלשכה הווטרינרית הרלוונטית. תוקף האישור הוא ל- 24 שעות בלבד.
3. מנהל הלשכה יאשר הוצאת הבקר ו/או הצאן לשחיטה בבית המטבחים, על פי הנחייתו של הרופא הווטרינר הראשי לבתי מטבחים.
4. בקשות חריגות תוגשנה בכתב למנהל השו"ט בשדה.
5. רכב היוצא ממשק שבאזור ההסגר, יחוטא על פי הוראות והנחיות מנהל הלשכה.
6. באחריות רופא בית המטבחים לוודא כי לאחר פריקת הבקר/הצאן במקום, ינוקה ויחוטא רכב ההובלה ממנו הורדו בעלי-החיים.
7. מנהל בית המטבחים, יאשר את שחיטת הבקר ו/או הצאן למנהל הלשכה הרלוונטית ולרופא הראשי לבתי המטבחים.
8. כל האישורים שניתנו להעברת הבקר/הצאן לפני ההכרזה - מבוטלים.
9. זמן המתנה להעברה לבית מטבחים בין האזורים השונים :

מקור בקר	מיקום בית המטבחים	זמן המתנה להעברה
מוקד	אזור הסגר	<u>3 שבועות</u> לאחר העלמות הסימנים הקליניים
מוקד	אזור חופשי	<u>2 חודשים</u> לאחר העלמות הסימנים הקליניים
אזור הסגר	אזור הסגר (אחר התפרצות רב מוקדית)	<u>3 שבועות</u> לאחר העלמות הסימנים הקליניים
אזור הסגר	אזור הסגר (אותו אזור הסגר)	ללא זמן המתנה
אזור הסגר	אזור חופשי	<u>3 שבועות</u> לאחר העלמות הסימנים הקליניים

מנהל השו"ט יקבע תנאים נוספים בהתאם לנדרש.

## נספח מספר 3 : הגדרת חיסון מלא בעת אירוע מחלת הפה והטלפיים

1. בקר וצאן יחוסנו 3 פעמים לפחות, טרם כניסתם לאזור ההסגר ולאזורים השונים (נספחים 1 ו-2).
2. אין להעביר בעלי החיים אלא בכפוף לפרקי הזמן המצויינים בנספחים 1 ו-2.
3. כאשר מדובר בבעלי חיים צעירים, החיסון הראשון יינתן בגיל חודשיים בצאן ובגיל 3 חודשים בבקר; החיסון השני יינתן בהפרש של לפחות חודש מהחיסון הראשון, והשלישי כעבור 3 חודשים במשק הפיטום.