

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה
השירותים הווטרינריים בשדה

תאריך: י"ד באלול תשס"ט
3 בספטמבר 2009
חוזר מספר: משב/2009/18

אל: מנהלי הלשכות הווטרינריות

הנדון: חיסון כללי – פה וטלפיים (פו"ט), 2009 – 2010

ביום 15.09.2009 יש להתחיל בחיסון הכללי כנגד מחלת הפה והטלפיים (פו"ט) בבקר, צאן וחזירים לעונת 2009 – 2010.

בקר

התרכיב הינו תלת-ערכי באמולסיה שומנית.

אצוות בשימוש: **O – 086**

ההרכב האנטיגני של התרכיב:

טיפוס **O¹** מכיל את האנטיגנים: O – 3039, O Geshur 85, O Manisa.

טיפוס **A¹** מכיל את האנטיגנים: A- 4165 + A22 Iraq.

טיפוס **ASIA** מכיל את האנטיגן: Asia 1 Shamir.

לקראת ההזרקה יובא התרכיב לטמפרטורה של $15^{\circ}\text{C} - 25^{\circ}\text{C}$. התרכיב יוזרק תוך שרירית בצוואר.

1. בקר לחלב:

יש לחסן את כל הבקר לחלב מגיל חודשיים (2 ח') ולסיים החיסון עד סוף חודש ינואר 2010.

- עגלים/ות ברפתות החלב יחוסנו לפחות פעמיים ($\times 2$) לכל המאוחר עד לגיל של 10 חודשים. החיסון השני יינתן לא יאוחר מ-4 חודשים לאחר קבלתו של החיסון הראשון. חיסון הפו"ט בעגלות ישולב עם חיסון זן 19.
- במסגרת החיסון השנתי **בדרום** (לשכת באר שבע) – בישובים סביב רצועת עזה ולאורך הגבול עם מצרים, כולל ישובי הערבה, ברצועה של 10 ק"מ המקבילה לגבול – יחוסן השגר, מגיל 2 חודשים ומעלה, בנוסף גם בתרכיב **אבעבועות צאן** כנגד מחלת קטרת העור.
- חיסון האנפלסמה וחיסונים נוספים אחרים יבוצעו עפ"י בקשת המגדל.
- אין לערבב את התרכיבים השונים.
- ברפתות בהן תבוצענה בדיקות השחפת, יש לשלב בדיקות אלה עם חיסון הפו"ט; חיסון הפו"ט יתבצע בזמן קריאת תוצאות בדיקת השחפת.

2. בקר לבשר (במרעה):

יש לחסן את כל הבקר לבשר מגיל 2 חודשים ומעלה ולסיים את החיסון לכל המאוחר עד סוף חודש ינואר 2010.

- את חיסון הפו"ט הראשון, בגילאים 2 – 4 חודשים, יש לשלב עם חיסון זן 19 (עגלות) ועם אנפלסמה. יש להתאים את מועד חיסון האמהות והוולדות לפי עונת ההמלטות בכל עדר.
- כל קבוצת גמילה לאחר החיסון הראשון תקבל חיסון דחף אחד נוסף כנגד פו"ט. (בכל כניסה לחיסון הגידול יש לחסן דחף את הקבוצה שחוסנה בכניסה הקודמת).
- עגלות תחלופה תהיינה מחוסנות לפחות פעמיים עד לגיל של 10 חודשים.
- אין להוציא עגלים מעדרי הבקר לבשר לפיטום במשקים אחרים אלא לאחר שחוסנו לפחות פעם אחת כנגד פו"ט.
- חיסונים נוספים ישולבו לפי הצורך.
- אין לערבב את התרכיבים השונים.

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה
השירותים הווטרינריים בשדה

3. חיסון במפטמות של עגלי יבוא ועגלים מקומיים

הנוהל שלהלן מחייב את כל הלשכות. כל לשכה תמנה רופא אחראי לנושא החיסונים במפטמות שמתפקידו יהיה להכין רשימה מפורטת (בלוח אקסל) של כל המפטמות בתחום הלשכה ולעקוב ולוודא אחר ביצוע תכנית החיסון.

ברשימה יצוין:

- א. תאריך הגעת העגלים למפטמה.
 - ב. מקור העגלים – ליד עגלי היבוא תצוין ארץ מוצאם.
 - ג. מצב החיסונים ומועד ביצועם טרם כניסת העגלים למפטמה.
- נא לתשומת לבכם: 6 – 8 שבועות לאחר הגעת העגלים למפטמה, חובה לחסנם בחיסון דחף כנגד פו"ט. ככלל, יש להיכנס לפחות אחת לארבעה חודשים לכל מפטמה!

הנחיות החיסון בהתאם למקור העגלים:

- (1) עגלים מקומיים (ילידי הארץ) הנמכרים מרפת החלב בגילאים של עד חודשיים – יחוסנו פעמיים במפטמה הקולטת עד גיל 6 חודשים.
- (2) עגלים גמולים מעדרי הבקר לבשר – יקבלו חיסון ראשון בעדר המקור וחיסון שני עד חודשיים לאחר קליטתם במפטמה.
- (3) עגלי יבוא מאירופה – יקבלו חיסון ראשון בתחנת ההסגר (רמלה או חיפה) וחיסון שני עד חודשיים לאחר קליטתם במפטמה.
- (4) עגלי יבוא מאוסטרליה – יחוסנו פעמיים בתחנות ההסגר (צופר ואילות) טרם העברתם למפטמות.

צאן

כל הצאן יחוסן בתרכיב O ובתרכיב A. התרכיבים לצאן הינם (בשלב הנוכחי) חד-ערכים באמולסיה שומנית.

אצוות בשימוש: **0 – 080** (O זן) + **0 – 099** (A זן)

ההרכב האנטיגני של התרכיבים:

טיפוס O מכיל את האנטיגנים: O – 3039, O Geshur 85, O Manisa.

טיפוס A מכיל את האנטיגן: A Iran 2005

- הצאן יחוסן מגיל חודשיים ומעלה, כל עדר במועדו השנתי.
- גיל חיסוני השגר – לאמהות מחוסנות מגיל 2 חודשים, לאמהות לא מחוסנות מגיל 1 יום.
- כבשים בוגרות יחוסנו בפו"ט, דבר ואבעבועות; עיזים בוגרות בפו"ט ודבר.
- טליות וגדיות יחוסנו בפו"ט, דבר ואובירב (Ovirev); טליות גם באבעבועות.
- טלאים יחוסנו בפו"ט, דבר ואבעבועות; גדיים בפו"ט ודבר.
- חובה לסמן **טליות וגדיות** בתוויות צהובות באוזן שמאל ולהזין במחשב את מספר התווית, שם הבעלים ומספר תעודת הזהות.
- חובה לסמן **טלאים וגדיים**, וכן **כבשים בוגרות ללא סימון**, בתוויות אדומות באוזן שמאל ולהזין במחשב את מספר התווית, שם הבעלים ומספר תעודת הזהות.

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה
השירותים הווטרינריים בשדה

חזירים

חזירים יחוסנו בתרכיב O ובתרכיב A. התרכיבים הינם (בשלב הנוכחי) חד-ערכים באמולסיה שומנית ומיועדים במיוחד לחזירים.

אצוות בשימוש: **P1-817P081 + O 7- 46008** (זן O); **0 – 099** (A זן)

ההרכב האנטיגני של התרכיבים:

טיפוס O מכיל את האנטיגנים: O Manisa, O Geshur 85, O – 3039.


טיפוס A מכיל את האנטיגן: A Iran 2005

נא להקפיד לקראת ההזרקה להביא את התרכיב לטמפרטורה של $15^{\circ}\text{C} - 25^{\circ}\text{C}$. התרכיב יוזרק תוך שרירית מאחורי האוזן.

במסגרת החיסון השנתי הכללי, בלשכת עכו-נצרת ובלשכת באר-שבע, יש לחסן את כל האמהות והמבכירות ("גיפרות") וכן את כל החזירים הצעירים והחזירות הצעירות המיועדים לעדר הרבייה.

כל חיסון אחר ו/או חיסון נוסף יבוצע לפי צורך ו/או עפ"י בקשת המגדל.

בברכה,



ד"ר ר. עוזרי

מנהל השירותים הווטרינריים בשדה

העתקים:

מנהל השירותים הווטרינריים
מנהל המכון הווטרינרי
ס/מנהל השו"ט (אמרכלות)
רופא וטרינר ראשי ליבוא ויצוא
רופא וטרינר ראשי לפיקוח על מוצרים מן החי
רופא וטרינר ראשי לבתי מטבחים
רופא וטרינר למחלות צאן
אחראי לנושא אפידמיולוגיה
מנהל המעבדה לפה וטלפיים
מנהל יחידת הפיצו"ח
רופא וטרינר ראשי "החקלאית"
רופא וטרינר רשות הטבע והגנים
רופא וטרינר - מנהל מקצועי, מאל"ה
רופא וטרינר, אחראי מחלבות

התאחדות מגדלי בקר

מועצת החלב

הסיירת הירוקה