



דף מידע למגדל

חיידיקי הברוצלה - העברה של החיידק בשדה מתקיימת בכמה דרכים:

- 1. הפלות:** החיידק נמצא **בשליה ובאברים הפנימיים של הנפל** בכמויות עצומות **כלבים וטורפים אחרים מסוגלים להעביר את החומר הנגוע (שיליות, נפלים)** למקומות נקיים (רפת, דיר) ועוזרים בכך להפצת החיידק. קרבת הכלב למגורי האדם מביאה את החיידק לפתחי הבית.
- 2. שתן וצואה:** זהו אמצעי חשוב נוסף לזיהום המרעה/המזון ולהפצת החיידק לבע"ח נוספים. עקב יכולת ההשרדות הטובה שלו, פיזורו מתגבר על ידי העלאת אבק, עקב תנועת בעלי חיים או במשב רוח. בהקשר זה, דרך הדבקה היא דרך הריריות בעין ובדרכי הנשימה.
- 3. חלב האם וקולוסטרום** מזוהמים בכמות רבה של חיידקי הברוצלה. לפיכך, יניקה/הגמעת יונקים בחלב מזוהם מעבירה את החיידק לצאצאים. בממשק מבוקר המשתמש בקולוסטרום מאוגד תהיה הדבקה המונית של היונקים במשק. אף על פי כן, היונקים יהיו בדרך כלל עמידים להוקעה וזו תתפרץ לעתים רק בבגרות כתוצאה מעקה, כגון בהריון. פיסטור הקולסטרום ו/החלב עשוי למנוע את הדבקת היונקים בחיידק.
- 4. רכישה בע"ח ממקור לא מבוקר ובדוק (בעקר צאן).**

המועצה לענף החלב בישראל - ייצור ושיווק (חל"צ)

המערך הארצי לבריאות העטין ואיכות החלב (מאל"ה):

ת.ד. 3553 פארק תעשייה קיסריה 3088900

טל: 04-6274477, פקס: 04-6274242

maale@milkg.org.il



משרד:

דרך החורש 4, יהוד

ת.ד. 97, יהוד, מיקוד: 5610002

טל: 03-9564750, פקס: 03-9564766

office@milkg.org.il

www.milkg.org.il



דרכי ההעברה החשובות של המחלה מבע"ח לאדם הן באמצעות :

1. שתיית חלב טרי נגוע או אכילת מוצרי גבינה שהוכנו מחלב לא מפוסטר, נגוע.
2. בין הגורמים המקצועיים (רופאים וטרינרים, מגדלים, ושוחטים בבתי מטבחים) הדרך הנפוצה להדבקה היא **במגע ישיר** עם חומר מזוהם. החיידק חודר דרך עור סדוק או בחדירה לפתחי הגוף, ארובות העיניים, האף ודרכי הנשימה כתוצאה מחשיפה לאבק או לתרסיסי טיפות מזוהמים.
- 3.

אז מה עושים ?

באירוע של **הפלות** – לדאוג להודיע לרופא הוטרינר המטפל ולשלוח דוגמאות מנפלים, שליות, דם, למעבדת השו"ט בבית דגן.

להודיע **לצוות הרפת** ולהסביר על מהות המחלה והדרכים להתגוננות מהדבקה.

להרחיק **ילדים ומבקרים** מזדמנים מהרפת/דיר.

לא לצרוך חלב ומוצרי חלב לא מפוסטרים - הדבר נכון לכל השנה וללא לקשר לארוע הקיים כרגע

להשתמש בכפפות חד פעמיות בהמלטות, בהרחקת שליות ונפלים, בחליבה בהגמעת יונקים בקולוסטרום ובחלב.

לפסטר קולוסטרום וחלב לפני הגמעת היונקים.

המשק נמצא בהסגר - אין למכור בע"ח / חלב ו/או לשלוח בדיקות חלב למעבדות כל עוד אין קבלת אישור לכך מהשירותים הוטרינרים.

ונשמרתם על נפשותכם... בהצלחה!!

המועצה לענף החלב בישראל - ייצור ושיווק (חל"צ)

המערך הארצי לבריאות העטין ואיכות החלב (מאל"ה):

ת.ד. 3553 פארק תעשייה קיסריה 3088900

טל: 04-6274477, פקס: 04-6274242

maale@milk.org.il



משרד:

דרך החורש 4, יהוד

ת.ד. 97, יהוד, מיקוד: 5610002

טל: 03-9564750, פקס: 03-9564766

office@milk.org.il

www.milk.org.il



המועצה לענף החלב בישראל - ייצור ושיווק (חל"צ)

המערך הארצי לבריאות העטין ואיכות החלב (מאל"ה):

ת.ד. 3553 פארק תעשייה קיסריה 3088900

טל: 04-6274477, פקס: 04-6274242

maale@milkg.org.il



משרד:

דרך החורש 4, יהוד

ת.ד. 97, יהוד, מיקוד: 5610002

טל: 03-9564750, פקס: 03-9564766

office@milkg.org.il

www.milkg.org.il